



دکتر یاشار رضاعی
جراح - دندانپزشک استادیار دانشگاه

۰۴۱ ۳۵۵۴۹۴۷۲

۰۹۳۳۳۴۱۱۰۱۰۰

مراقبت‌های بعد از ترمیم ریشه (عصب کشی)

- برای چند روز اول پس از درمان دندان شده امکان دارد دردهای کم یا زیادی داشته باشد ؛ به طوریکه این دردها در روزهای اولیه بیشتر بوده و به صورت دردهای خود به خود و ضرباندار و مساسیت دندان به لمس و فشار ، خود را نشان می دهد و پس از این مدت ، دردهای خود به خود به تدریج کمتر شده و فقط به هنگام ضربه (غذا خوردن یا بر خورد دندان به دندان فک مقابل) درد می گیرد و در نهایت دردها کاملاً از بین می رود . در مواردی به علت وجود التهاب شدید و یا عفونتهای قبل از درمان ، این دردها می توانند مادتر و شدیدتر بوده و گاه همراه تورم باشد که جای نگرانی نداشته و با مراجعه تیمویز داروهای لازم مشکل برطرف می گردد.

- سوالی که بسیاری از بیماران می پرسند این است که اگر دندانم معالجه ریشه شده است ، چرا هنوز درد دارم؟
در مرحله ابتدائی درمان ریشه به علت قطع نمودن و خارج کردن عروق و اعصاب از کانال ریشه ، یک زخم و التهابی در اطراف ریشه دندان در استخوان ایجاد می گردد و مانند هر جای دیگری از بدن که اگر عضوی قطع و مجروح شود ، ممل آن تا مدتی دردناک و ملتهب خواهد بود ، در مورد دردهای بعد از درمان ریشه هم علت درد ، زخم و التهاب نامیه قطع عصب در استخوان اطراف ریشه دندان (و نه در کانال ریشه تمیز شده و پر شده) می باشد . بنابراین وجود دردهای احتمالی بعد از درمان موجب نگرانی شما نشود . حالت درد بر اساس شدت التهاب ، عفونت قبلی کانالها ، تعداد کانالها و در افراد مختلف فرق می کند .

- درمان ریشه دندانها در بیش از ۹۰٪ موارد با موفقیت همراه است و عدم موفقیت آن گاه با انجام عصب کشی مجدد و قطع ریشه قابل نگهداری است.

-دندان عصب کشی شده بعلت نداشتن عصب به پوسیدگی ، سرما و گرما مساس نبوده و در صورت بهداشت ضعیف برامتی پوسیده می گردد و بعلت خارج کردن عصب و ممتویات پالپ دندان مرده همانند یک دندان زنده و ممتکم نبوده و باید از خوردن غذاهای سفت و شکننده اجتناب کرد . چنانچه پر کردگیهای تاج بسیار وسیع باشد جهت جلوگیری از شکستگی دندان بایستی زیرروکش رود.